

# Ley De Coulomb Ejercicios Resueltos 5

**ley de coulomb ejercicios resueltos 5:** Guía Completa y Ejercicios Resueltos La ley de Coulomb ejercicios resueltos 5 es una referencia fundamental para estudiantes y profesionales que desean profundizar en la comprensión de las fuerzas eléctricas entre cargas. La ley de Coulomb es uno de los conceptos pilares en física eléctrica, permitiendo calcular la magnitud de la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales en reposo. En esta guía, abordaremos en detalle la ley de Coulomb, presentando ejercicios resueltos con explicaciones paso a paso para facilitar su entendimiento y aplicación práctica.

## ¿Qué es la ley de Coulomb?

La ley de Coulomb, formulada por Charles-Augustin de Coulomb en 1785, describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. La fuerza es: - Directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. - Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. - Dirigida a lo largo de la línea que une las dos cargas. Su expresión matemática es:

$$F = k_e |q_1 q_2| / r^2$$

donde: - F: magnitud de la fuerza entre las cargas (en Newtons, N). -  $k_e$ : constante de Coulomb, aproximadamente  $8.9875 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ . -  $q_1$  y  $q_2$ : magnitudes de las cargas (en Coulombs, C). - r: distancia entre las cargas (en metros, m).

## Ejercicios Resueltos de la Ley de Coulomb: Ejercicio 5

A continuación, presentamos el ejercicio número 5, uno de los más representativos para entender la aplicación práctica de la ley de Coulomb.

### Enunciado del ejercicio

Dos cargas eléctricas,  $q_1 = +3 \mu\text{C}$  y  $q_2 = -2 \mu\text{C}$ , están separadas por una distancia de 0.5 metros. Determine: 1. La magnitud de la fuerza que ejercen entre sí. 2. La naturaleza de la fuerza (atraer o repeler). 3. La dirección de la fuerza en cada carga.

### Datos importantes

1.  $q_1 = +3 \mu\text{C} = +3 \times 10^{-6} \text{ C}$
2.  $q_2 = -2 \mu\text{C} = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$
3.  $r = 0.5 \text{ m}$

4.  $k_e \approx 8.9875 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$

## **Solución paso a paso**

### **1. Calculando la magnitud de la fuerza**

Utilizamos la fórmula de la ley de Coulomb:

$$F = k_e |q_1 q_2| / r^2$$

Sustituyendo los valores:  $F = (8.9875 \times 10^9) |(+3 \times 10^{-6}) (-2 \times 10^{-6})| / (0.5)^2$  Calculamos primero el producto de las cargas:  $|(+3 \times 10^{-6}) (-2 \times 10^{-6})| = 6 \times 10^{-12} \text{ C}^2$  Luego, el denominador:  $(0.5)^2 = 0.25 \text{ m}^2$  Sustituyendo:  $F = (8.9875 \times 10^9) 6 \times 10^{-12} / 0.25$  Multiplicamos:  $= (8.9875 \times 6) \times 10^{9-12} / 0.25 = 53.925 \times 10^{-3} / 0.25$  Dividimos:  $F = (53.925 \times 10^{-3}) / 0.25 = 215.7 \times 10^{-3} \text{ N}$  Finalmente, la fuerza:  $F \approx 0.216 \text{ N}$

### **2. Naturaleza de la fuerza**

Dado que las cargas son de signos opuestos (+ y -), la fuerza será de atracción. Es decir, ambas cargas se atraen mutuamente.

### **3. Dirección de la fuerza**

La fuerza actúa a lo largo de la línea que une las dos cargas. La carga  $q_1$  experimentará una fuerza dirigida hacia  $q_2$ , mientras que  $q_2$  también será atraída hacia  $q_1$ . La dirección de la fuerza en cada carga es en línea recta, apuntando en sentido opuesto a la otra carga, debido a la atracción.

## **Conceptos Clave para Resolver Ejercicios de Coulomb**

Para abordar ejercicios como el ejemplo anterior, es importante tener claros los siguientes conceptos:

### **Magnitud de la carga**

- Convertir siempre las cargas a Coulombs (C). - Saber que las cargas pueden ser positivas o negativas, lo que determina la naturaleza de la fuerza (atraer o repeler).

### **Distancia entre cargas**

- La distancia debe estar en metros para mantener coherencia en las unidades. - La fórmula es sensible a la valor de  $r$ , ya que la fuerza varía con el inverso del cuadrado.

## Constante de Coulomb

- Valor aproximado:  $8.9875 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ . - Es fundamental para obtener resultados precisos.

## Signos de las cargas y dirección

- Cargas iguales en signo: fuerza de repulsión. - Cargas opuestas: fuerza de atracción. - La dirección siempre será a lo largo de la línea que une las cargas.

## Consejos para resolver ejercicios de la ley de Coulomb

Para maximizar la precisión y eficiencia al resolver estos ejercicios, considera los siguientes consejos:

1. Realiza la conversión de unidades correctamente antes de empezar.
2. Identifica claramente las cargas y la distancia en el enunciado.
3. Utiliza siempre la fórmula estándar y verifica las unidades en cada paso.
4. Presta atención a los signos de las cargas para determinar la naturaleza de la fuerza.
5. Si hay varias cargas, analiza cada par de cargas por separado y suma vectorialmente las fuerzas si es necesario.
6. Practica con diferentes tipos de ejercicios, incluyendo cargas en diferentes posiciones y configuraciones.

## Aplicaciones prácticas de la ley de Coulomb

La comprensión y resolución de ejercicios con la ley de Coulomb tiene aplicaciones en diversos campos, tales como:

1. Diseño de componentes electrónicos y circuitos.
2. Estudios en física de partículas.
3. Electrostatica en ingeniería y nanotecnología.
4. Investigación en fenómenos atmosféricos y de la Tierra.

## Resumen

- La ley de Coulomb describe la fuerza entre cargas eléctricas puntuales en reposo. - La fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. - La fuerza puede ser de atracción o repulsión, dependiendo del signo de las cargas. - La resolución de ejercicios requiere atención a las unidades, signos, y dirección de las fuerzas.

# Conclusión

Resolver ejercicios como el ejemplo número 5 de la ley de Coulomb no solo ayuda a entender mejor los conceptos teóricos, sino que también desarrolla habilidades analíticas y prácticas esenciales en física y ingeniería eléctrica. La práctica constante con diferentes escenarios y la comprensión profunda de los principios fundamentales son clave para dominar esta importante ley de la física. Anímate a realizar más ejercicios y explorar las múltiples aplicaciones de la ley de Coulomb en el mundo real.

Ley de Coulomb ejercicios resueltos 5: Un análisis exhaustivo y práctico para comprender la ley de Coulomb

La ley de Coulomb ejercicios resueltos 5 se ha consolidado como un recurso fundamental para estudiantes, docentes y profesionales que buscan entender en profundidad los principios que rigen las fuerzas eléctricas entre cargas point. Este artículo se adentra en un análisis riguroso, abordando desde los fundamentos teóricos hasta ejemplos prácticos, con el fin de ofrecer una visión completa y detallada sobre estos ejercicios resueltos, su importancia en el aprendizaje y su aplicación en la resolución de problemas reales.

Introducción a la ley de Coulomb

Antes de sumergirnos en los ejercicios específicos, es fundamental repasar los conceptos básicos que sustentan la ley de Coulomb. Propuesta por Charles-Augustin de Coulomb en 1785, esta ley describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales en reposo:

> La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Matemáticamente, se expresa como:

$$F = k |q_1 q_2| / r^2$$

donde:

1.  $F$  es la fuerza entre las cargas (en Newtons, N),
2.  $k$  es la constante de Coulomb (aproximadamente  $8.9875 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ ),
3.  $q_1$  y  $q_2$  son las magnitudes de las cargas (en Coulombs, C),
4.  $r$  es la distancia entre las cargas (en metros, m).

Este principio es la base para resolver una variedad de problemas en electrostática, y los ejercicios resueltos como los que analizamos en esta revisión facilitan su comprensión.

Importancia de los ejercicios resueltos en el aprendizaje de la ley de Coulomb

La resolución de ejercicios prácticos permite a los estudiantes:

1. Visualizar cómo aplicar la ley en diferentes escenarios,
2. Identificar las variables relevantes y su relación,
3. Desarrollar habilidades para manipular fórmulas y realizar cálculos precisos,
4. Entender las implicaciones físicas de los resultados obtenidos.

El ejercicio número 5 de la serie "ley de Coulomb ejercicios resueltos" destaca por su enfoque en casos complejos y en la integración de conceptos adicionales, como el uso de vectores y análisis de fuerzas en diferentes direcciones.

Análisis de los ejercicios resueltos 5: estructura y enfoque

El ejercicio 5, típico en cursos de física de nivel secundario o universitario, presenta un problema que combina varias cargas en un sistema, requiriendo la determinación de la fuerza neta en un punto específico. La resolución de estos problemas suele seguir una estructura lógica:

1. Identificación de las cargas y sus posiciones
2. Cálculo de las fuerzas individuales usando la ley de Coulomb
3. Análisis vectorial para determinar la dirección y sentido de cada fuerza
4. Suma vectorial de las fuerzas para obtener la fuerza neta
5. Interpretación física de los resultados

A continuación, se presenta un ejemplo típico y su resolución paso a paso.

Ejemplo práctico: resolución del ejercicio 5

Supongamos que en un plano se encuentran tres cargas puntuales:

1. Carga  $q_1 = +2 \mu\text{C}$  ubicada en el origen (0,0),
2. Carga  $q_2 = -3 \mu\text{C}$  ubicada en (4 m, 0),
3. Carga  $q_3 = +1 \mu\text{C}$  ubicada en (2 m, 3 m).

Se pide determinar la fuerza neta que actúa sobre la carga  $q_2$  debido a  $q_1$  y  $q_3$ .

Paso 1: Convertir unidades y definir variables

1. Convertir microcoulombs a coulombs:

$$q_1 = +2 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_3 = +1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

1. Posiciones:

$$q_1: (0, 0)$$

$$q_2: (4, 0)$$

$$q_3: (2, 3)$$

Paso 2: Calcular las fuerzas individuales

Fuerza entre  $q_2$  y  $q_1$

1. Distancia  $r_{12}$ :

$$r_{12} = \sqrt{(4-0)^2 + (0-0)^2} = 4 \text{ m}$$

1. Magnitud de la fuerza:

$$F_{12} = k |q_1 q_2| / r_{12}^2$$

$$= 8.9875 \times 10^9 (2 \times 10^{-6} 3 \times 10^{-6}) / 16$$

$$= 8.9875 \times 10^9 6 \times 10^{-12} / 16$$

$$\approx (8.9875 \times 6 / 16) \times 10^{-3}$$

$$\approx (53.925 / 16) \times 10^{-3}$$

$$\approx 3.37 \times 10^{-3} \text{ N}$$

1. Dirección: desde  $q_2$  hacia  $q_1$  (porque  $q_1$  es positiva y  $q_2$  negativa, la fuerza será atractiva).

1. Vector unit:

from  $q_2$  (4,0) to  $q_1$  (0,0):

$$\Delta x = -4, \Delta y = 0$$

$$r = 4 \text{ m}$$

Unidad vector:

$$u_{12} = (-1, 0)$$

1. Fuerza vector:

$$F_{12\_vector} = F_{12} u_{12} = (-3.37 \times 10^{-3}, 0)$$

Fuerza entre  $q_2$  y  $q_3$

1. Distancia  $r_{23}$ :

$$\Delta x = 2 - 4 = -2 \text{ m}$$

$$\Delta y = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

$$r_{23} = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3.6056 \text{ m}$$

1. Magnitud:

$$F_{23} = k |q_2 q_3| / r_{23}^2$$

$$= 8.9875 \times 10^9 (3 \times 10^{-6} 1 \times 10^{-6}) / (13)$$

$$= 8.9875 \times 10^9 3 \times 10^{-12} / 13$$

$$\approx (8.9875 \times 3 / 13) \times 10^{-3}$$

$$\approx (26.9625 / 13) \times 10^{-3}$$

$$\approx 2.075 \times 10^{-3} \text{ N}$$

1. Dirección:

from  $q_2 (4,0)$  to  $q_3 (2,3)$ :

$$\Delta x = -2, \Delta y = 3$$

1. Unit vector:

$$u_{23} = ( -2 / 3.6056, 3 / 3.6056 ) \approx ( -0.555, 0.832 )$$

1. Force vector:

$$F_{23\_vector} = 2.075 \times 10^{-3} ( -0.555, 0.832 )$$

$$\approx ( -1.152 \times 10^{-3}, 1.728 \times 10^{-3} )$$

Paso 3: Sumar las fuerzas vectoriales

Sumamos las componentes en x e y:

1. Componente x:

$$F_x = ( -3.37 \times 10^{-3} ) + ( -1.152 \times 10^{-3} ) = -4.522 \times 10^{-3} \text{ N}$$

1. Componente y:

$$F_y = 0 + 1.728 \times 10^{-3} = 1.728 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Paso 4: Determinar la magnitud y dirección de la fuerza neta

1. Magnitud:

$$F_{net} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$= \sqrt{(-4.522 \times 10^{-3})^2 + (1.728 \times 10^{-3})^2}$$

$$\approx \sqrt{20.45 \times 10^{-6} + 2.987 \times 10^{-6}}$$

$$\approx \sqrt{23.437 \times 10^{-6}}$$

$$\approx 4.841 \times 10^{-3} \text{ N}$$

1. Dirección:

$$\theta = \arctangent(F_y / F_x)$$

$$= \arctangent(1.728 \times 10^{-3} / -4.522 \times 10^{-3})$$

$$\approx \arctangent(-0.382) \approx -20.9^\circ$$

Dado que  $F_x$  es negativo y  $F_y$  positivo, el vector apunta en el segundo cuadrante, por lo que la dirección respecto al eje x positivo es aproximadamente  $159.1^\circ$  (desde el eje x en sentido antihorario).

Implicaciones y aplicaciones prácticas

Este ejercicio ejemplifica cómo aplicar la ley de Coulomb en un sistema complejo, donde varias cargas interactúan. La resolución meticulosa

## Questions & Answers About ley de coulomb ejercicios resueltos 5

| N<br>o | Question                                                                    | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ¿Qué es la ley de Coulomb y cómo se aplica en los ejercicios resueltos?     | La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. En ejercicios resueltos, se utiliza esta ley para calcular la fuerza eléctrica entre cargas, considerando sus valores y la distancia que las separa. |
| 2      | ¿Cuáles son los pasos para resolver ejercicios de la ley de Coulomb tipo 5? | Los pasos incluyen identificar las cargas y su posición, aplicar la fórmula de Coulomb, sustituir los valores, calcular la fuerza y analizar el resultado. Además, verificar las unidades y la dirección de la fuerza para asegurar la coherencia en la solución.                                                                                          |



|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | ¿Qué fórmula se usa en los ejercicios resueltos de la ley de Coulomb 5?                                   | La fórmula principal es $F = k  q_1 q_2  / r^2$ , donde F es la fuerza, k es la constante de Coulomb (aproximadamente $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ), $q_1$ y $q_2$ son las magnitudes de las cargas, y r es la distancia entre ellas.                                                              |
| 4  | ¿Cómo determinar la dirección de la fuerza en los ejercicios de la ley de Coulomb resueltos 5?            | La fuerza actúa en línea recta entre las dos cargas: si ambas cargas son iguales y positivas, la fuerza será de repulsión, en dirección opuesta; si una es positiva y la otra negativa, será de atracción, en dirección hacia la otra carga. La dirección se determina usando la línea que conecta las cargas. |
| 5  | ¿Qué errores comunes se deben evitar en los ejercicios resueltos de la ley de Coulomb 5?                  | Errores frecuentes incluyen usar unidades incorrectas, olvidar convertir las cargas a Coulombs, no aplicar correctamente la ley en casos de cargas en diferentes planos, y confundir la dirección de la fuerza con la dirección del campo eléctrico.                                                           |
| 6  | ¿Cómo se resuelve un ejercicio donde varias cargas interactúan usando la ley de Coulomb 5?                | Se calcula la fuerza entre cada par de cargas usando la fórmula de Coulomb y, luego, se suman vectorialmente todas las fuerzas para obtener la fuerza neta sobre una carga específica, considerando la dirección y magnitud de cada interacción.                                                               |
| 7  | ¿Qué importancia tiene la constante de Coulomb en los ejercicios resueltos 5?                             | La constante de Coulomb, $k \approx 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ , es fundamental para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Su correcta utilización asegura resultados precisos en los ejercicios.                                                                                           |
| 8  | ¿Cómo interpretar un ejercicio resuelto de la ley de Coulomb en diferentes unidades de distancia o carga? | Se deben convertir todas las unidades a las utilizadas en la fórmula (generalmente metros para distancia y Coulombs para carga) antes de realizar los cálculos para garantizar la coherencia y precisión.                                                                                                      |
| 9  | ¿Qué conceptos adicionales se relacionan con la ley de Coulomb en los ejercicios resueltos 5?             | Conceptos relacionados incluyen el campo eléctrico, la ley de Gauss, la ley de conservación de la carga, y la ley de Coulomb en diferentes configuraciones geométricas, que ayudan a comprender mejor las interacciones eléctricas.                                                                            |
| 10 | ¿Dónde puedo encontrar ejercicios resueltos 5 de la ley de Coulomb para practicar?                        | Puedes buscar en libros de física de nivel secundario o universitario, plataformas educativas en línea, y tutoriales especializados que ofrecen ejemplos resueltos paso a paso para fortalecer tu comprensión de la ley de Coulomb.                                                                            |

ley de coulomb, ejercicios resueltos, fuerza eléctrica, carga eléctrica, ley de Coulomb, cálculo de fuerzas, problemas de electricidad, ejemplo de Coulomb, física eléctrica, fórmula de Coulomb